



**Autors:** Victòria Andreu<sup>1</sup>, Enric Brullet<sup>2</sup>, Claudia Consiglieri<sup>3</sup>, Pilar Garcia Iglesias<sup>4</sup>, Esther Garcia Planella<sup>4</sup>, Montse Garcia Retortillo<sup>5</sup>, Jordi Guardiola<sup>6</sup>, Manuela Hombrados<sup>6</sup>, Gemma Ibáñez<sup>7</sup>, Leticia Moreira<sup>7</sup>, Maria Pellisé<sup>7</sup>, Marta Piqueras<sup>8</sup>, Veronica Pons<sup>9</sup>, Ignasi Puig<sup>10</sup>, Oriol Sendino<sup>7</sup>, Francesc Vida<sup>10</sup>, Rafel Campo<sup>2</sup>.

**Hospitals:** H Viladecans<sup>1</sup>, H Sabadell (C.S.U. Parc Taulí)<sup>2</sup>, H U Bellvitge<sup>3</sup>, H Sant Pau<sup>4</sup>, H Mar<sup>5</sup>, H U Girona Dr. J. Trueta<sup>6</sup>, H Clínic<sup>7</sup>, CST de Terrassa<sup>8</sup>, H U Vall d'Hebron<sup>9</sup>, ALTHAIA X. A. Manresa<sup>10</sup>.

## Coagulació, antiagregació i profilaxi antibiòtica

### Profilaxi antibiòtica

Procediment	Condicció clínica	Profilaxi antibiòtica*	Comentaris
Qualsevol	Pròtesis cardíques i vasculars**	No recomanada	No hi ha casos reportats d'infecció relacionats amb endoscòpia
Qualsevol	Pròtesis articulars	No recomanada	Molt baix risc d'infecció
Qualsevol	Cirrosi amb sagnat agut	Indicada	El risc d'infecció bacteriana està ben establert
CPRE amb drenatge complet	Obstrucció biliar sense colangitis	No recomanada	
CPRE previsió de drenatge incomplet (CEP, estenosi hiliar)	Obstrucció biliar sense colangitis	Recomanada	
CPRE	Col·lecció pancreàtica estèril (pseudoquist, necrosi comunicada amb conducte pancreàtic)	Recomanada	
USE-PAAF	Lesió sòlida en el tracte digestiu superior	No recomanada	Índexs baixos de bacterièmia i infecció local
USE-PAAF	Lesió sòlida en el tracte digestiu inferior	Informació insuficient per establir una recomanació	S'ha de seleccionar cas per cas; un sol estudi indica baix risc d'infecció
USE-PAAF	Lesions quístiques al costat del tracte GI (incloent-hi el mediastí)	Recomanada	
Drenatge transmural	Col·lecció pancreàtica estèril	Recomanada	
Gastrostomia d'alimentació	Tots els pacients	Recomanada	Redueix la taxa d'infecció de les parts toves

\* Valorar segons la política antibiòtica de cada centre

\*\* Pròtesis vasculars sintètiques, pròtesis valvulars metàl·liques, altres dispositius cardiovasculars no valvulars o portadors de marcapassos

Banerjee S, et al. *Gastrointest Endosc* 2008;67:791-798